

AMINO Active



ZLOŽENIE

Hnojivo ES (typ C.2.1), v zmysle nariadenia ES č. 2003/2003.

Roztok hnojiva NPK 5-4-6, s obsahom mangánu (Mn).

Celkový obsah dusíka (N): 5% (60 g/l)

Amónny dusík (N): 1,5%

Močovínový dusík (N): 2%

Oxid fosforečný (P₂O₅): 4% (50 g/l), rozpustný vo vode

Oxid draselný (K₂O): 6% (75 g/l), rozpustný vo vode

Mangán (Mn): 0,1%, rozpustný vo vode, chelátovaný EDTA

CHARAKTERISTIKA

AMINO Active je komplexné hnojivo s obsahom fyzio-stimulačných látok:

- Aminokyselín a peptidov urýchľujúcich rozvoj rastlín
- Extraktov z morských rias so stimulačnými účinkami
- Prekurzormi hormónov a betaínmi znižujúcimi stres rastlín

Výhody prípravku **AMINO Active**:


- Podporuje vývoj koreňovej sústavy
- Napomáha rozvoju rastlín v každom vývojovom štádiu
- Podporuje fixáciu dusíka
- Stimuluje procesy fotosyntézy a oddaluje procesy starnutia pletív
- Aktivuje procesy vývoja rezistencie rastlín voči ochoreniam, stresu a pod.



AMINO Active je prírodný fyzio-stimulant



Aminokyseliny podporujú vývoj rastlín až do ich zberu



Betaíny stabilizujú bunecné membrány počas období osmotického stresu

APLIKÁCIA ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA FYTOTOXICITY

PLODINA	DÁVKA	VÝVOJOVÉ ŠTÁDIUM
OBILNINY	1-2 l/ha	Aplikujte spolu s jesenným herbicídny m ošetrením; Aplikujte spolu alebo po herbicídnom ošetrení.
CUKROVÁ REPA	0,5-0,75 l/ha	Na jednu aplikáciu; od 2. herbicídneho postreku.
KUKURICA	1-2 l/ha	Spolu s herbicídny m ošetrením.
OLEJNINY, REPKA, SÓJA, SLNEČNICA	1-2 l/ha	Spolu s opakovaným herbicídny m ošetrením alebo s 1. insekticídny m ošetrením.

APLIKÁCIA ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA STRESUJÚCICH VPLYVOV

VŠETKY PLODINY	1-2 l/ha	Pri výskyte všetkých foriem stresujúcich vplyvov: nedostatok vlhky - mechanické poškodenie a pod.
-----------------------	----------	---

Pre všetky polia ...

BALENIE : 10 L

1 rue Quesnay - 02000 LAON - FRANCE

Tel : +33(0)3 23 80 10 18

www.s-d-p.fr

www.vetagro.sk